

Vogel wacht Utrecht 55



UIT DE OUDE DOOS

In de oude doos zitten verenigingsbladen van de Vogelwacht Utrecht: Mededelingen van 1960 t/m 1970 en De Braakbal van 1971 t/m 1976. In dit lustrumjaar zal ik daaruit teksten kiezen die mij opvielen.

Jan van Nes

Mededelingen november 1969 - Excursieverslagen

Zaterdag 6 september vertrokken wij met slechts 9 deelnemers voor een zeer geslaagde excursie naar de polder Zuid-Flevoland. Het aantal soorten (53 uit en thuis) illustreert weliswaar niet het belang van deze tocht, maar er werden bijzonder interessante waarnemingen gedaan. Zo namen wij vlak voor de brug bij Muidersberg een Flamingo waar, die rustig zijn kostje ophaalde bij een modderig eilandje. Andere delicatessen: een Grauwe Franjepoot, ontdekt door Ton van Balken, 2 Casarca-eenden, 4 Lepelaars, 4 Vuurgoudhaantjes en een paar Krakeenden. Van de andere soorten noemen we: 9 ♀♀ (of juv.)

Brune Kiekendieven en 1 ♂, honderden Kluten en kempahaantjes, grote troepen wintertalingen, wilde eenden en tafeleenden, troepen watersnippen, veel bonte strandlopers, vele tientalen grauwe ganzen, bergeenden, veel bonte strandlopers waartussen bontbekjes en strandplevieren, vrij wat aalscholvers, een waterral (Hr. Bronswijk), een enkele toppereend, groepjes pijlstaarten, tientalen zwarte sterns, enkele videsifjes, enkele bosrueters, gele en witte kwikken, ± 8 tapuiten, slechts 3 torenvalken en honderden sloeënden.

Mededelingen februari 1969 - Plaatselijke afdelingen

Reeds lang is het bestuur er zich van bewust, dat het gebied van de provincie Utrecht veel te groot is om de verwezenlijking van de doelstellingen van onze vereniging van uit één centraal punt op efficiënte wijze te kunnen nastreven. Overwogen wordt dan ook, om tot decentralisatie over te gaan, in dier voege, dat op daarvoor in aanmerking komende plaatsen plaatselijke afdelingen zouden kunnen worden opgericht. Om een voorbeeld te noemen; Amersfoort zou naar het voorkomt een geschikte plaats zijn om een plaatselijke afdeling op te richten, eventueel in vereniging met Leusden, Woudenberg, Hamersveld en Hoogland. Een ander voorbeeld; Jutphaas, IJsselstein en Benschop, of Maarssen, Breukelen en Vreeland.

Deze plaatselijke afdelingen, elk onder een eigen bestuur, zouden zich dan kunnen belasten met alle specifieke lokale beschermingsactiviteiten, terwijl, indien het zou gelukken de gehele provincie op deze wijze "op te delen", het bestuur der vereniging zich zou kunnen bepalen tot aangelegenheden de

Vogel wacht Utrecht 55



gehele vereniging betreffende, zoals het Mededelingenblad en beschermingszaken op provinciaal niveau.

De Braakbal november 1970 - Redactieel

Aan de lezers.

Voor u ligt het oude "Mededelingen" in een nieuw jasje en met een nieuwe naam. De nieuwe naam is een probeersel. Mogelijk wekt hij bij sommigen minder prettige associaties. Maar wie ooit een braakbal zorgvuldig heeft uitgeplozen, zal hieruit heel wat interessante gegevens gehaald hebben. Dit stond ons voor ogen bij de keuze van de nieuwe naam. Gaarne uw commentaar, eventueel andere suggesties.

De redactie.



De Braakbal januari 1971 - Ingezonden brieven

- De redactie ontving op haar verzoek om commentaar op het nieuwe jasje en de nieuwe naam van ons blad slechts één schriftelijke reactie. De heer Bronswijk liet ons weten het noch met het een noch met het ander eens te zijn. Hij zond ons een ontwerp voor de omslag. Hij was bereid nog andere ontwerpen te maken.

Aangezien ons mondeling wel een aantal positieve reacties bereikt hebben, willen wij hierop (nog) niet ingaan. Mochten meer mensen bezwaren hebben, dan kan dit in de jaarvergadering besproken worden.

- De secretaris ontving van dr. van Ramshorst, Tacituslaan 4 Utrecht, een brief waarin hij melding maakt van 2 vogels, welke hij herhaalt de malen waarnam.

Hij schrijft:

"De vogels lijken op het eerste gezicht flinke merels, maar ze zijn duidelijk wat groter. Hoofdkleur is donkerbeige-bruin, zeer egaal zonder ENIGE tekening van stippen, vlekken en dergelijke, maar de KOP is zeer donker, bijna zwart. Als ze zitten valt een zilverwitte rand op aan het uiteinde van de staart, ongeveer 1 cm. of iets minder breed, terwijl ook aan de vleugels enig wit langs de rand te zien is. Zodra ze gaan vliegen, blijkt er echter zeer veel wit aan hun vleugels te zijn, n.l. het gehele middelste deel van de vleugels is zilverwit".

De heer van Ramshorst vraagt wat dit kan zijn. Inmiddels hebben wij vernomen dat in de Uithof herhaalt de malen SIBERISCHE LIJSTERS gesignaliseerd zijn.

Vogel wacht Utrecht 55



De beschrijving hiervan klopt voor een groot deel met de door de heer van Ramshorst waargenomen vogels, m.n. de witte vleugelvlek. De tuin van de heer van Ramshorst ligt vlak bij de Uithof. Het is dus waarschijnlijk dat deze waarneming dezelfde Si berische Lijsters betreft.

De Braakbal november 1971 - Verslag regionale afdelingen Zeist

In mei t/m juli werden de nestkasten in het Zeister Bos, Kozakkenbos, Panbos en Kerckebos gecontroleerd. Van de 370 nestkasten waren er +/- 90 bezet. De meesten waren bezet door koolmezen en pimpelmezen. Specifictatie van de bewoners van de nestkasten, uitzonderd de kool- en pimpelmezen; Grote Bonte Specht 1; Boomklever 2; Boomkruiper 2; Zwarte Mees 5; Glanskopmees 10; Kuffmees 2; Ringmus 2; Bonte Vliegenvanger 3; Grauwe Vliegenvanger 1; Gekraagde Roodstaart 3; Eekhoorn 1.

Deze vogels zijn niet geringd, omdat de Bosbouwkundig Ambtenaar, de Heer Visser, er geen tijd voor gehad heeft.

Bij onze eerste schoonmaak hebben wij in het Kozakkenbos in de 32 nestkasten 16 bevruchte en onbevruchte eieren aangetroffen. Gezien dit hoge percentage willen wij een onderzoek instellen. Onze gedachten gaan uit naar verschillende mogelijke oorzaken:

- a. inteelt
- b. vergiftiging
- c. overbevolking

Verder zijn bij ons in het werkgebied nog enkele broedgevallen bekend van Boomvalk (jongen uitgevlogen, aantal onbekend),



GEKRAAGDE ROODSTAARTJE 78.

H. Si kkema (Vogel album van K. TIKTAK, Koffie en Theehandel, 1928)

Vogel wacht Utrecht 55



Goudvink, Zwarte Specht, Oeverzwaluwen en Bosuilen.

Het ontbreken van voldoende tijd, heeft ons niet in staat kunnen stellen de bossen verder op broedgevallen te inventariseren. Wij hopen het komende seizoen met dit werk te kunnen aanvangen.

De Braakbal januari 1972 - WINTERVOEDERING

De organisatie van de wintervoeding op grote schaal en van de moeilijk bereikbare vogels zal een taak zijn van de samenwerkende regionale afdelingen. Iedere afdeling zal een speciale vertegenwoordiger hiervoor aanstellen, by wie men eventueel grotere concentraties hongerende vogels of noodlijdende vogels met speciaal menu (reigers e.d.) kan melden.

Voor de "particuliere" wintervoederaar volgen hier enkele richtlijnen:

1. reiger, roerdomp: kippenmagen, ongezouten vis.
2. eendensoorten, meerkoet, waterhoen; graan, groenteafval, rauwe kort-gesneden aardappelschillen, brood (liefst gedrenkt in gesmolten vet).
3. spechten: vetbollen, grote lappen spekzwoerd, pinda's, gebonden tegen boomstammen.
4. kleinere vogels: lijsterachtigen, vinkensoorten, gorzen, mezen, boomklever, ringmus, spreeuw, enz.: rotte appels en peren of schillen hiervan, onkruidzaden, vogelzaad, koolzaad, hennepzaad, zonnepitten, brood (eventueel gedrenkt in gesmolten vet), zoutloze keukenafval (o.a. gekookte aardappels of aardappelschillen), ongekookte haver, spekzwoerd, pinda's, kaaskorsten (waarvan beslist het plastic buitenlaagje verwijderd MOET zijn).

In tuinen de voerplaatsen zodanig kiezen dat de vogels niet onverhoeds door katten besprongen kunnen worden.

Tijdstip van voeren: 's ochtends en liefst ook (zeker bij langdurende en felle vorstperiodes) tegen de avond. Drinkwater: bij sneeuw niet nodig; bij droge vorst: ijsblokjes tot gruis verpulveren en bij de voerplaats uitstrooien.